

10 EFFETS SECONDAIRES

fréquemment rencontrés sous
NEUROLEPTIQUES / ANTIPSYCHOTIQUES

ABILIFY®
Aripiprazole

SOLIAN®
Amisulpride

LEPONEX®
Clozapine

HALDOL®
Halopéridol

ZYPREXA®
Olanzapine

XEROQUEL®
Quétiapine

RISPERDAL®
Risperidone

TERCIAN®
Cyamémazine

LOXAPAC®
Loxapine

LARGACTIL®
Chlorpromazine

NOZINAN®
Lévomépromazine

Somnolence, fatigue

Éviter la conduite dans la mesure du possible.
Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Baisse de motivation

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Mouvements involontaires, contractures musculaires, crampes, tremblements

Négocier une diminution de dose, un changement de médicament, ou l'ajout d'un médicament correcteur anticholinergique.

Vertiges, palpitations, étourdissements, malaises, en se levant

Se lever très lentement.
Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Bouche sèche

Boire souvent de l'eau, sucer des glaçons, bonbons ou pastilles sans sucre, mâcher des chewing-gums sans sucre.
Négocier une diminution de dose, un changement de médicament, l'ajout d'un médicament correcteur (anétholtrithione : SULFARLEM®) ou d'un spray de salive artificielle.

Vision floue, difficulté à lire

Éviter la conduite dans la mesure du possible.
Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Constipation

Marcher, faire de l'exercice, manger beaucoup de fruits crus et de légumes, boire beaucoup d'eau notamment le matin à jeun.
Négocier une diminution de dose, un changement de médicament ou la prescription d'un médicament laxatif.

Prise de poids

Marcher, faire de l'exercice, manger beaucoup de fruits crus et de légumes, boire beaucoup d'eau notamment le matin à jeun.
Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Impatiences, sensations d'inconfort

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Baisse de libido, frigidité, impuissance

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.