

ANTIDÉPRESSEURS

SYNDROME D'ARRÊT, DE DISCONTINUATION, DE SEVRAGE

Les symptômes ci-dessous peuvent apparaître lors de l'interruption ou de la diminution trop rapide d'un traitement antidépresseur. Bien que la plupart des molécules soient concernées, celles qui ont une demi-vie courte semblent poser le plus de problèmes (ex. paroxétine et venlafaxine). Il est généralement conseillé de reprendre le médicament ou de réaugmenter la dose, puis de la diminuer très progressivement, par paliers, voire de changer de médicament au profit d'une molécule à demi-vie plus longue et/ou en solution buvable (ex. fluoxétine) qui sera plus facile à interrompre de façon similaire.



Anxiété, nervosité
Irritabilité, accès de colère
Attaques de panique
Pleurs, crises de larmes



Maux de tête
Sensations de brûlure,
d'engourdissement, de
picotements
Sensations de chocs
électriques dans le cerveau



Nausées
Vomissements
Diarrhée
Ballonnement
Crampes et brûlures
d'estomac



Fatigue, confusion
Difficultés de concentration
Troubles de la mémoire
Étourdissements, vertiges
Problèmes de coordination
Sentiment d'irréalité ou de
détachement



Insomnie et troubles du
sommeil
Augmentation des rêves
ou des cauchemars



Nez qui coule
Modification de
l'odorat



Hypersensibilité
aux sons
Sons ou bruits
dans les oreilles



Agitation
Tremblements
Impatiences dans les jambes
Tension, douleurs musculaires
Crampes, spasmes, contractures



Mouvements incontrôlables
de la bouche et de la langue
Salivation inhabituelle
Modification du goût
Difficulté à parler clairement



Fièvre
Frissons
Transpiration



Sautes d'humeur
Exaltation
Élévation de l'humeur
Baisses soudaines de
moral



Vision floue
Irritation des yeux
Perceptions visuelles
inhabituelles

Paroxétine (Deroxat®)
Fluvoxamine (Floxyfral®)
Escitalopram (Seroplex®)
Citalopram (Seropram®)
Sertraline (Zoloft®)
Fluoxétine (Prozac®)
Vortioxétine (Brintellix®)

Venlafaxine (Effexor®)
Duloxétine (Cymbalta®)
Milnacipran (Ixel®)

Moclobémide (Moclamine®)
Iproniazide (Marsilid®)

Clomipramine (Anafranil®)
Amitriptyline (Laroxyl®)
Maprotiline (Ludiomil®)
Amoxapine (Defanyl®)
Dosulépine (Prothiaden®)
Doxépine (Quitaxon®)
Trimipramine (Surmontil®)
Imipramine (Tofranil®)